


Profil socio-sanitaire Ile-de-France



IDF

Indicateurs socio-démographiques

- ❖ Population totale en 2006 : 11.532.409
 - Dont moins de 20 ans : 25,9 %
 - Dont 75 ans et plus : 6,1 %
 - Dont vivant seuls : 43,0 %
- ❖ Chômage parmi les actifs en 2010 : 8,4 %
- ❖ Revenu fiscal médian par unité de consommation en 2007 : 20.575 € (France métropolitaine : 17.497 €)
- ❖ Part des étrangers en 2006 : 12,4 % (moyenne France métropolitaine : 5,8 %)
- ❖ Ménages dont au moins 75 % des ressources viennent des prestations des Caisses d'allocations familiales en 2008 : 6,1 % (moyenne France : 6,7 %)
- ❖ Naissances vivantes en 2008 : 180.668
 - Dont mères âgées de moins de 20 ans : 1,2 %
 - Dont mères âgées de 35 ans et plus : 25,8 %
- ❖ Enfants de moins de 20 ans vivant dans un ménage à bas revenus (moins de 903 euros par unité de consommation) en 2006 : 19,5 %
- ❖ Indice conjoncturel de fécondité en 2007 : 1,99 enfants par femme
- ❖ Bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en 2009 : 5,9 %
- ❖ Familles monoparentales en 2006 : 15,8 %
- ❖ Professions et catégories sociales en 2006
 - Part des cadres : 26,9 %
 - Part des ouvriers : 14,5 %
- ❖ Nombre de bénéficiaires (assurés et ayants droits) de l'Aide médicale d'Etat (AME) en 2008 : 139.693
- ❖ Personnes de 15 ans et plus jamais scolarisées ou scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme en 2006 : 12,1 %
- ❖ Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) en 2006 : 11,0 % (moyenne France métropolitaine : 6,8 %)

Indicateurs socio-sanitaires

	75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	France métro.
Caractéristiques socio-démographiques										
1. Indice conjoncturel de fécondité	1,58	2,10	2,09	2,15	1,96	2,37	2,03	2,22	1,99	1,96
2. Familles monoparentales (en %)	17,1	13,1	12,8	14,0	16,3	19,8	17,4	15,5	15,8	13,1
3. Personnes ≥ 15 ans peu/pas diplômées (en %)	8,8	12,5	10,3	11,0	9,9	20,2	12,7	13,5	12,1	13,7
4. Taux de chômage localisé parmi les actifs	9,1	7,3	6,8	6,8	7,7	11,4	8,1	9,0	8,4	9,5
5. Enfants vivant dans un ménage pauvre (en %)	19,5	16,2	11,8	16,5	15,0	33,4	20,8	21,3	19,5	nd
6. Bénéficiaires de la CMUC (en %)	7,9	3,9	3,3	4,4	4,0	10,6	5,3	5,6	5,9	5,8
7. Population vivant dans des ZUS (en %)	5,8	5,9	8,3	13,6	10,8	20,5	10,5	16,1	11,0	6,8
Espérance de vie										
8. Espérance de vie à la naissance - hommes	79,6	77,4	79,7	79,1	79,9	77,9	78,9	78,4	78,0	77,5
9. Espérance de vie à la naissance - femmes	85,5	83,5	85,6	84,9	85,4	84,1	84,0	84,0	84,9	84,3
10. Espérance de vie à 60 ans - hommes	23,3	21,6	23,4	23,0	23,5	22,2	22,8	22,4	22,9	21,9
11. Espérance de vie à 60 ans - femmes	28,0	25,9	27,8	27,1	27,7	26,7	27,2	26,4	27,3	26,7
Mortalité toutes causes*										
12. TSM générale - hommes	608,3	730,3	612,6	631,5	592,3	701,4	634,2	673,6	639,9	722,0
13. TSM générale - femmes	351,5	423,8	360,2	369,1	349,5	402,3	363,1	398,0	371,4	394,8
14. TSM prématurée - hommes	241,9	251,3	209,9	226,9	218,7	269,2	236,0	238,4	236,6	273,8
15. TSM prématurée - femmes	120,9	120,8	107,7	110,6	112,2	135,2	117,8	123,7	118,6	122,7
16. TSM prématurée évitable - hommes	62,0	85,2	76,3	80,9	71,7	79,1	69,5	85,3	74,8	103,2
17. TSM prématurée évitable - femmes	20,8	25,6	26,2	24,5	23,9	24,4	22,7	26,9	24,1	29,0
18. Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances)	3,6	3,7	3,7	3,8	3,5	5,4	3,5	3,9	3,9	3,6
Morbidité et mortalité : cancers*										
19. TSM par cancers - hommes	209,6	249,6	216,3	215,9	210,7	246,8	231,1	241,3	225,1	243,0
20. TSM par cancers - femmes	122,4	127,6	116,8	116,1	116,5	125,9	118,2	124,3	120,8	118,0
21. TSM prématurée par cancers - hommes	87,7	99,4	86,4	88,5	88,4	101,3	95,7	96,0	92,4	104,3
22. TSM prématurée par cancers - femmes	58,4	57,8	53,8	54,8	56,2	59,5	56,8	60,0	57,2	57,5
23. TSI médico-sociale des cancers - hommes	410,4	459,0	434,6	453,3	440,5	396,2	436,3	467,0	433,9	435,3
24. TSI médico-sociale des cancers - femmes	374,8	363,2	354,8	358,2	349,1	317,9	351,9	358,4	355,0	346,1
25. TSM par cancer du poumon - hommes	53,7	63,6	54,0	55,9	54,1	70,1	63,4	58,0	58,5	62,9
26. TSM par cancer du poumon - femmes	18,6	15,6	14,5	15,4	16,8	17,1	18,1	15,0	16,7	14,3
27. TSI médico-sociale du cancer du poumon - hommes	47,1	48,8	47,7	49,5	48,5	55,2	50,1	53,9	49,8	50,1
28. TSI médico-sociale du cancer du poumon - femmes	22,3	17,1	16,8	18,7	17,4	17,2	17,7	19,5	18,7	15,5
29. TSM par cancer du sein - femmes	27,3	28,1	25,9	27,1	25,0	24,8	25,3	26,2	26,3	24,8
30. TSI médico-sociale du cancer du sein - femmes	168,3	155,3	156,7	151,0	157,3	133,6	152,0	156,8	155,1	149,4
31. TSI médico-sociale du cancer colorectal - hommes	40,1	42,8	42,0	41,9	41,1	42,3	43,8	44,0	42,0	43,0
32. TSI médico-sociale du cancer colorectal - femmes	31,1	34,6	32,2	33,5	30,6	27,6	32,2	30,8	31,5	30,8
33. TSI médico-sociale du cancer du col de l'utérus	8,6	8,4	6,8	9,7	8,6	9,1	9,8	9,8	8,8	8,7
Morbidité et mortalité : maladies cardiovasculaires*										
34. TSM par maladies cardiovasculaires - hommes	123,7	173,4	147,1	149,3	137,3	163,1	145,2	148,7	145,1	177,0
35. TSM par maladies cardiovasculaires - femmes	70,6	100,2	88,6	88,3	80,2	94,2	82,8	95,4	84,8	103,1
36. TSI médico-sociale hypertension artérielle - hommes	246,2	308,5	206,4	241,5	198,4	258,2	265,7	207,5	241,2	181,6
37. TSI médico-sociale hypertension artérielle - femmes	180,3	263,7	171,4	198,5	154,2	250,5	223,1	180,9	199,1	158,0
38. TSI médico-sociale des AVC - hommes	71,1	67,5	57,2	63,0	61,5	68,8	67,4	66,3	65,5	57,0
39. TSI médico-sociale des AVC - femmes	38,4	43,9	37,5	42,3	37,3	43,2	37,5	40,4	39,8	38,9

 Valeur minimum

 Valeur maximum

* TSM : Taux standardisé de mortalité pour 100.000 et TSI : Taux standardisé d'incidence pour 100.000
Standardisation sur la population européenne.


	75	77	78	91	92	93	94	95	IDF	France métro.
Morbidité et mortalité : VIH/sida										
40. Découvertes de séropositivité pour 100.000 hbts	58,8	12,1	8,0	nd	17,9	35,3	nd	21,7	26,5	10,3
41. Découvertes de séropositivité au stade tardif (%)	24,2	20,0	42,9	25,0	27,7	32,2	21,4	31,8	26,8	27,6
42. Nombre de décès liés au VIH/sida	76	11	24	26	31	48	34	20	270	728
Morbidité et mortalité : tuberculose										
43. Nombre annuel de cas déclarés de tuberculose (TB)	605	147	129	165	185	459	175	221	2086	5589
44. Incidence de la TB chez les Français (pr 100.000)	12,4	6,8	7,2	7,0	6,0	14,3	6,4	8,6	8,4	5,4
45. Incidence de la TB chez les étrangers (pr 100.000)	112,9	49,4	41,0	35,6	51,6	109,0	61,6	81,8	79,0	56,2
Morbidité et mortalité : santé mentale*										
46. Taux de suicide - hommes (pr 100.000)	4,9	16,6	16,3	19,6	10,1	7,8	4,1	17,6	11,3	23,6
47. Taux de suicide - femmes (pr 100.000)	2,5	5,6	7,5	6,3	5,6	3,7	2,8	6,8	4,9	7,9
48. TSI médico-sociale des patho. psy. - hommes	159,5	147,4	114,5	132,5	127,8	158,4	144,4	139,7	141,5	149,1
49. TSI médico-sociale des patho. psy. - femmes	159,2	174,8	131,9	155,8	136,7	173,7	152,4	145,6	153,6	158,6
Morbidité : autres*										
50. TSI médico-sociale du diabète - hommes	305,2	381,0	293,3	346,9	316,6	455,1	381,0	415,0	356,0	320,2
51. TSI médico-sociale du diabète - femmes	165,5	256,0	190,1	237,5	188,7	346,7	241,4	288,6	230,4	221,0
52. TSI médico-sociale de la mal. d'Alzheimer - hommes	36,8	43,7	42,1	45,7	42,5	34,7	39,6	43,7	40,7	36,5
53. TSI médico-sociale de la mal. d'Alzheimer - femmes	48,8	54,6	51,8	59,8	51,6	45,4	48,9	60,3	51,9	52,5
Addictions et conséquences sanitaires*										
54. Usagers réguliers d'alcool à 17 ans (%)	11,0	7,0	8,0	7,0	11,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,9
55. TSM prémat. par alcoolisme et cirrhose - hommes	9,4	13,3	13,0	15,4	15,2	14,4	12,5	17,2	13,4	18,8
56. TSM prémat. par alcoolisme et cirrhose - femmes	3,0	5,3	5,4	5,4	4,4	6,0	4,6	5,8	4,8	6,0
57. Usagers quotidiens de tabac à 17 ans (%)	35,0	27,0	23,0	23,0	26,0	20,0	20,0	22,0	25,0	28,9
58. TSM prémat. par cancers poumon et larynx - hommes	25,4	30,7	25,0	26,8	26,9	32,3	30,2	28,1	27,9	33,0
59. TSM prémat. par cancers poumon et larynx - femmes	10,2	9,0	8,7	8,1	9,4	8,7	10,5	8,5	9,3	9,1
60. Usagers réguliers de cannabis à 17 ans (%)	12,0	8,0	6,0	10,0	9,0	5,0	5,0	8,0	8,0	7,3
61. Ventes de Subutex® en pharmacie pr 100 hbts	32,9	15,0	13,3	15,6	14,9	27,9	16,6	14,0	20,6	23,1
62. Nombre annuel de décès par surdose	4	3	6	8	4	4	0	7	36	275

Notes sur les indicateurs (définition, année de production, sources)

1. 2007, Insee. 2. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 3. % de personnes de ≥ 15 ans non scolarisées n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme, 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 4. Données provisoires en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières, 1er trimestre 2010, Insee. 5. Enfants de < 20 ans vivant dans un ménage sous le seuil de revenus de 903 euros par unité de consommation, 2006, Mipes. 6. 2009, Cnamts, MSA, RSI, Insee. 7. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 8-11. 2007, Insee. 12-13. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee. 14-15. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee. 16-17. Mortalité avant 65 ans attribuable à certains comportements individuels, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. Les écarts importants de taux observés entre les départements et la France viennent en grande partie de la différence de déclaration des décès par suicide. 18. 2006-2008, Insee. 19-20. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee. 21-22. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee. 23-24. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF. 25-26. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee. 27-28. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF. 29. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee. 30-33. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF. 34-35. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee. 36-37. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF. 38-39. Incidence des accidents vasculaires cérébraux, 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF. 40. Estimation InVS des découvertes de séropositivité, données au 31.12.2008 corrigées pour la sous-déclaration, les délais et les valeurs manquantes - nd : non dispo. car transmission irrégulière et/ou sous-déclaration importante. Pour Paris : à considérer avec prudence (transmission irrégulière + données manquantes). Données IDF et France entière issues du BEHWeb n°2, Novembre 2009. Insee : données du recensement 2006. 41. stade sida ou symptomatique non sida, données, hors stade clinique non renseigné, au 31.12.2008, InVS, exploitation ORS IDF. 42. 2007, Inserm CépiDc. 43. 2008, InVS. 44-45. 2006, InVS, Insee, exploitation ORS IDF. 46-47. Sous-déclaration des décès par suicide dans les départements franciliens relevant territorialement de l'Institut médico-légal de Paris (hors Val-d'Oise et Yvelines), 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee. 48-53. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF. 54. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad. 55-56. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. 57. 2008, OFDT, Escapad. 58-59. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. 60. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad. 61. Ventes annuelles en pharmacie de ville pour 100 habitants de 20-39 ans, exprimé en nombre "théorique" de boîtes de comprimés de Subutex® dosés à 8 mg, 2008, Iliad/OFDT - InVS. 62. 2006, Iliad/OFDT - CépiDc.


Disparités sociales et territoriales

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus parmi la population par département en 2007




Source : Insee, recensement de la population

Part des bénéficiaires de la CMU par département au 31 décembre 2008




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les hommes par département - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les femmes par département - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Octobre 2010

SANTÉ DES FRANCILIENS


Ce document a été élaboré par Sandrine Halfen, Adrien Saunal, Pierre Laurent, Philippe Pépin et Isabelle Grémy

Observatoire régional de santé d'Ile-de-France
 21-23, RUE MIOLLIS 75732 PARIS CEDEX 15 - TÉL : 01 44 42 64 70 - FAX : 01 44 42 64 71
 e-mail : ors-idf@ors-idf.org - Site internet : www.ors-idf.org

L'ORS Ile-de-France est subventionné par
 la Préfecture de région d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
 et par le Conseil régional d'Ile-de-France

ISBN : 978-2-7371-1793-0

Profil socio-sanitaire Paris




75




Indicateurs socio-démographiques

- ❖ Population totale en 2006 : 2.181.374
Dont moins de 20 ans : 19,5 %
Dont 75 ans et plus : 7,4 %
Dont vivant seuls : 15,0 %
- ❖ Part des étrangers en 2006 : 15,0 % (moyenne régionale : 12,4 %)
- ❖ Naissances vivantes en 2008 : 30.623
Dont mères âgées de moins de 20 ans : 0,7 %
Dont mères âgées de 35 ans et plus : 33,1 %
- ❖ Indice conjoncturel de fécondité en 2007 : 1,58 enfants par femme
- ❖ Familles monoparentales en 2006 : 17,1 %
- ❖ Professions et catégories sociales en 2006
Part des cadres : 43,3 %
Part des ouvriers : 7,4 %
- ❖ Personnes de 15 ans et plus jamais scolarisées ou scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme en 2006 : 8,8 %
- ❖ Chômage parmi les actifs en 2010 : 9,1 %
- ❖ Revenu fiscal médian par unité de consommation en 2007 : 23.408 € (moyenne régionale : 20.575 €)
- ❖ Ménages dont au moins 75 % des ressources viennent des prestations des Caisses d'allocations familiales en 2008 : 6,3 % (moyenne régionale : 6,1 %)
- ❖ Enfants de moins de 20 ans vivant dans un ménage à bas revenus (moins de 903 euros par unité de consommation) en 2006 : 19,5 %
- ❖ Bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en 2009 : 7,9 %
- ❖ Nombre de bénéficiaires (assurés et ayants droits) de l'Aide médicale d'Etat (AME) en 2008 : 61.650
- ❖ Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) en 2006 : 5,8 % (moyenne régionale : 11,0 %)

Indicateurs socio-sanitaires






Notes sur les indicateurs (définition, année de production, sources)

1. 2007, Insee. 2. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 3. % de personnes de ≥ 15 ans non scolarisées n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme, 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 4. Données provisoires en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières, 1er trimestre 2010, Insee. 5. Enfants de < 20 ans vivant dans un ménage sous le seuil de revenus de 903 euros par unité de consommation, 2006, Mipex 6. 2009, Cnamts, MSA, RSI, Insee 7. 2006, Insee, exploitation ORS IDF 8-11. 2007, Insee 12-13. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 14-15. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 16-17. Mortalité avant 65 ans attribuable à certains comportements individuels, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. Les écarts importants de taux observés entre les départements et la France viennent en grande partie de la différence de déclaration des décès par suicide 18. 2006-2008, Insee 19-20. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 21-22. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 23-24. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 25-26. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 27-28. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 29. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 30-33. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 34-35. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 36-37. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 38-39. Incidence des accidents vasculaires cérébraux, 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 40. Estimation InVS des découvertes de séropositivité, données au 31.12.2008 corrigées pour la sous-déclaration, les délais et les valeurs manquantes - nd : non dispo. car transmission irrégulière et/ou sous-déclaration importante. Pour Paris : à considérer avec prudence (transmission irrégulière + données manquantes). Données IDF et France entière issues du BEHWeb n°2, Novembre 2009. Insee : données du recensement 2006 41. stade sida ou symptomatique non sida, données, hors stade clinique non renseigné, au 31.12.2008, InVS, exploitation ORS IDF 42. 2007, Inserm CépiDc 43. 2008, InVS 44-45. 2006, InVS, Insee, exploitation ORS IDF 46-47. Sous-déclaration des décès par suicide dans les départements franciliens relevant territorialement de l'Institut médico-légal de Paris (hors Val-d'Oise et Yvelines), 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 48-53. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 54. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 55-56. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 57. 2008, OFDT, Escapad 2008 58-59. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 60. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 61. Ventes annuelles en pharmacie de ville pour 100 habitants de 20-39 ans, exprimé en nombre "théorique" de boîtes de comprimés de Subutex® dosés à 8 mg, 2008, Iliad/OFDT - InVS 62. 2006, Iliad/OFDT - CépiDc.

Nous remercions Frédéric Imbert, ORS Alsace, de l'aide apportée pour la réalisation des graphiques.


Disparités sociales et territoriales

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus parmi la population par arrondissement en 2007




Source : Insee, recensement de la population

Part des bénéficiaires de la CMU par arrondissement au 31 décembre 2008




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les hommes par arrondissement - période 2004-2007



Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les femmes par arrondissement - période 2004-2007



Ecart par rapport à la moyenne régionale (Test du Chi2)

- Sous-mortalité significative au seuil de 5%
- Ecart non significatif au seuil de 5%
- Sur-mortalité significative au seuil de 5%

Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Ce document a été élaboré par Sandrine Halfen, Adrien Saunal, Pierre Laurent, Philippe Pépin et Isabelle Grémy


Observatoire régional de santé d'Ile-de-France
 21-23, RUE MIOLLIS 75732 PARIS CEDEX 15 - TÉL : 01 44 42 64 70 - FAX : 01 44 42 64 71
 e-mail : ors-idf@ors-idf.org - Site internet : www.ors-idf.org

L'ORS Ile-de-France est subventionné par
 la Préfecture de région d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
 et par le Conseil régional d'Ile-de-France

ISBN : 978-2-7371-1793-0

Octobre 2010

Profil socio-sanitaire Seine-et-Marne



Principales communes de plus de 10.000 habitants


77




Indicateurs socio-démographiques

- ❖ Population totale en 2006 : 1.273.491
Dont moins de 20 ans : 28,6 %
Dont 75 ans et plus : 5,3 %
Dont vivant seuls : 36,7 %
- ❖ Part des étrangers en 2006 : 7,5 % (moyenne régionale : 12,4 %)
- ❖ Naissances vivantes en 2008 : 19.240
Dont mères âgées de moins de 20 ans : 1,6 %
Dont mères âgées de 35 ans et plus : 20,9 %
- ❖ Indice conjoncturel de fécondité en 2007 : 2,10 enfants par femme
- ❖ Familles monoparentales en 2006 : 13,1 %
- ❖ Professions et catégories sociales en 2006
Part des cadres : 15,9 %
Part des ouvriers : 19,9 %
- ❖ Personnes de 15 ans et plus jamais scolarisées ou scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme en 2006 : 12,5 %
- ❖ Chômage parmi les actifs en 2010 : 7,3 %
- ❖ Revenu fiscal médian par unité de consommation en 2007 : 19.980 € (moyenne régionale : 20.575 €)
- ❖ Ménages dont au moins 75 % des ressources viennent des prestations des Caisses d'allocations familiales en 2008 : 4,6 % (moyenne régionale : 6,1 %)
- ❖ Enfants de moins de 20 ans vivant dans un ménage à bas revenus (moins de 903 euros par unité de consommation) en 2006 : 16,2 %
- ❖ Bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en 2009 : 3,9 %
- ❖ Nombre de bénéficiaires (assurés et ayants droits) de l'Aide médicale d'Etat (AME) en 2008 : 4.467
- ❖ Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) en 2006 : 5,9 % (moyenne régionale : 11,0 %)

Indicateurs socio-sanitaires



* TSM : Taux standardisé de mortalité pour 100.000 et TSI : Taux standardisé d'incidence pour 100.000
Standardisation sur la population européenne.




Notes sur les indicateurs (définition, année de production, sources)

1. 2007, Insee. 2. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 3. % de personnes de ≥ 15 ans non scolarisées n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme, 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 4. Données provisoires en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières, 1er trimestre 2010, Insee. 5. Enfants de < 20 ans vivant dans un ménage sous le seuil de revenus de 903 euros par unité de consommation, 2006, Mipex 6. 2009, Cnamts, MSA, RSI, Insee 7. 2006, Insee, exploitation ORS IDF 8-11. 2007, Insee 12-13. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 14-15. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 16-17. Mortalité avant 65 ans attribuable à certains comportements individuels, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. Les écarts importants de taux observés entre les départements et la France viennent en grande partie de la différence de déclaration des décès par suicide 18. 2006-2008, Insee 19-20. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 21-22. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 23-24. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 25-26. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 27-28. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 29. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 30-33. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 34-35. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 36-37. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 38-39. Incidence des accidents vasculaires cérébraux, 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 40. Estimation InVS des découvertes de séropositivité, données au 31.12.2008 corrigées pour la sous-déclaration, les délais et les valeurs manquantes - nd : non dispo. car transmission irrégulière et/ou sous-déclaration importante. Pour Paris : à considérer avec prudence (transmission irrégulière + données manquantes). Données IDF et France entière issues du BEHWeb n°2, Novembre 2009. Insee : données du recensement 2006 41. stade sida ou symptomatique non sida, données, hors stade clinique non renseigné, au 31.12.2008, InVS, exploitation ORS IDF 42. 2007, Inserm CépiDc 43. 2008, InVS 44-45. 2006, InVS, Insee, exploitation ORS IDF 46-47. Sous-déclaration des décès par suicide dans les départements franciliens relevant territorialement de l'Institut médico-légal de Paris (hors Val-d'Oise et Yvelines), 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 48-53. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 54. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 55-56. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 57. 2008, OFDT, Escapad 2008 58-59. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 60. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 61. Ventes annuelles en pharmacie de ville pour 100 habitants de 20-39 ans, exprimé en nombre "théorique" de boîtes de comprimés de Subutex® dosés à 8 mg, 2008, Iliad/OFDT - InVS 62. 2006, Iliad/OFDT - CépiDc.

Nous remercions Frédéric Imbert, ORS Alsace, de l'aide apportée pour la réalisation des graphiques.


Disparités sociales et territoriales

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus parmi la population par commune en 2007




Source : Insee, recensement de la population

Part des bénéficiaires de la CMU par commune au 31 décembre 2008




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les hommes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les femmes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

* Le découpage « canton ville » de l'Insee est un regroupement d'une (en zone urbaine) ou plusieurs (en zone rurale) commune(s) entière(s).

Ce document a été élaboré par Sandrine Halfen, Adrien Saunal, Pierre Laurent, Philippe Pépin et Isabelle Grémy

Observatoire régional de santé d'Ile-de-France
 21-23, RUE MIOLLIS 75732 PARIS CEDEX 15 - TÉL : 01 44 42 64 70 - FAX : 01 44 42 64 71
 e-mail : ors-idf@ors-idf.org - Site internet : www.ors-idf.org

L'ORS Ile-de-France est subventionné par
 la Préfecture de région d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
 et par le Conseil régional d'Ile-de-France

ISBN : 978-2-7371-1793-0

Octobre 2010

SANTÉ DES FRANCILIENS

Profil socio-sanitaire Yvelines



78





Principales communes de plus de 10.000 habitants

Indicateurs socio-démographiques

- ❖ Population totale en 2006 : 1.395.807
 - Dont moins de 20 ans : 27,7 %
 - Dont 75 ans et plus : 5,8 %
 - Dont vivant seuls : 37,4 %
- ❖ Chômage parmi les actifs en 2010 : 6,8 %
- ❖ Revenu fiscal médian par unité de consommation en 2007 : 23.626 € (moyenne régionale : 20.575 €)
- ❖ Part des étrangers en 2006 : 8,7 % (moyenne régionale : 12,4 %)
- ❖ Ménages dont au moins 75 % des ressources viennent des prestations des Caisses d'allocations familiales en 2008 : 3,6 % (moyenne régionale : 6,1 %)
- ❖ Naissances vivantes en 2008 : 19.895
 - Dont mères âgées de moins de 20 ans : 1,0 %
 - Dont mères âgées de 35 ans et plus : 25,7 %
- ❖ Enfants de moins de 20 ans vivant dans un ménage à bas revenus (moins de 903 euros par unité de consommation) en 2006 : 11,8 %
- ❖ Indice conjoncturel de fécondité en 2007 : 2,09 enfants par femme
- ❖ Bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en 2009 : 3,3 %
- ❖ Familles monoparentales en 2006 : 12,8 %
- ❖ Professions et catégories sociales en 2006
 - Part des cadres : 28,7 %
 - Part des ouvriers : 13,4 %
- ❖ Nombre de bénéficiaires (assurés et ayants droits) de l'Aide médicale d'Etat (AME) en 2008 : 3.575
- ❖ Personnes de 15 ans et plus jamais scolarisées ou scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme en 2006 : 10,3 %
- ❖ Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) en 2006 : 8,3 % (moyenne régionale : 11,0 %)

Indicateurs socio-sanitaires






Notes sur les indicateurs (définition, année de production, sources)

1. 2007, Insee. 2. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 3. % de personnes de ≥ 15 ans non scolarisées n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme, 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 4. Données provisoires en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières, 1er trimestre 2010, Insee. 5. Enfants de < 20 ans vivant dans un ménage sous le seuil de revenus de 903 euros par unité de consommation, 2006, Mips 6. 2009, Cnamts, MSA, RSI, Insee 7. 2006, Insee, exploitation ORS IDF 8-11. 2007, Insee 12-13. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 14-15. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 16-17. Mortalité avant 65 ans attribuable à certains comportements individuels, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. Les écarts importants de taux observés entre les départements et la France viennent en grande partie de la différence de déclaration des décès par suicide 18. 2006-2008, Insee 19-20. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 21-22. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 23-24. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 25-26. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 27-28. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 29. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 30-33. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 34-35. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 36-37. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 38-39. Incidence des accidents vasculaires cérébraux, 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 40. Estimation InVS des découvertes de séropositivité, données au 31.12.2008 corrigées pour la sous-déclaration, les délais et les valeurs manquantes - nd : non dispo. car transmission irrégulière et/ou sous-déclaration importante. Pour Paris : à considérer avec prudence (transmission irrégulière + données manquantes). Données IDF et France entière issues du BEHWeb n°2, Novembre 2009. Insee : données du recensement 2006 41. stade sida ou symptomatique non sida, données, hors stade clinique non renseigné, au 31.12.2008, InVS, exploitation ORS IDF 42. 2007, Inserm CépiDc 43. 2008, InVS 44-45. 2006, InVS, Insee, exploitation ORS IDF 46-47. Sous-déclaration des décès par suicide dans les départements franciliens relevant territorialement de l'Institut médico-légal de Paris (hors Val-d'Oise et Yvelines), 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 48-53. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 54. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 55-56. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 57. 2008, OFDT, Escapad 2008 58-59. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 60. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 61. Ventes annuelles en pharmacie de ville pour 100 habitants de 20-39 ans, exprimé en nombre "théorique" de boîtes de comprimés de Subutex® dosés à 8 mg, 2008, Iliad/OFDT - InVS 62. 2006, Iliad/OFDT - CépiDc.

Nous remercions Frédéric Imbert, ORS Alsace, de l'aide apportée pour la réalisation des graphiques.


Disparités sociales et territoriales

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus parmi la population par commune en 2007




Source : Insee, recensement de la population

Part des bénéficiaires de la CMU par commune au 31 décembre 2008




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les hommes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les femmes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

* Le découpage « canton ville » de l'Insee est un regroupement d'une (en zone urbaine) ou plusieurs (en zone rurale) commune(s) entière(s).

Ce document a été élaboré par Sandrine Halfen, Adrien Saunal, Pierre Laurent, Philippe Pépin et Isabelle Grémy

Observatoire régional de santé d'Ile-de-France
 21-23, RUE MIOLLIS 75732 PARIS CEDEX 15 - TÉL : 01 44 42 64 70 - FAX : 01 44 42 64 71
 e-mail : ors-idf@ors-idf.org - Site internet : www.ors-idf.org

L'ORS Ile-de-France est subventionné par
 la Préfecture de région d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
 et par le Conseil régional d'Ile-de-France

ISBN : 978-2-7371-1793-0

Profil socio-sanitaire Essonne



Principales communes de plus de 10.000 habitants


91




Indicateurs socio-démographiques

- ❖ Population totale en 2006 : 1.198.274
 - Dont moins de 20 ans : 27,6 %
 - Dont 75 ans et plus : 5,5 %
 - Dont vivant seuls : 38,1 %
- ❖ Part des étrangers en 2006 : 8,6 % (moyenne régionale : 12,4 %)
- ❖ Naissances vivantes en 2008 : 18.134
 - Dont mères âgées de moins de 20 ans : 1,4 %
 - Dont mères âgées de 35 ans et plus : 22,7 %
- ❖ Indice conjoncturel de fécondité en 2007 : 2,15 enfants par femme
- ❖ Familles monoparentales en 2006 : 14,0 %
- ❖ Professions et catégories sociales en 2006
 - Part des cadres : 21,4 %
 - Part des ouvriers : 16,3 %
- ❖ Personnes de 15 ans et plus jamais scolarisées ou scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme en 2006 : 11,0 %
- ❖ Chômage parmi les actifs en 2010 : 6,8 %
- ❖ Revenu fiscal médian par unité de consommation en 2007 : 21.334 € (moyenne régionale : 20.575 €)
- ❖ Ménages dont au moins 75 % des ressources viennent des prestations des Caisses d'allocations familiales en 2008 : 4,8 % (moyenne régionale : 6,1 %)
- ❖ Enfants de moins de 20 ans vivant dans un ménage à bas revenus (moins de 903 euros par unité de consommation) en 2006 : 16,5 %
- ❖ Bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en 2009 : 4,4 %
- ❖ Nombre de bénéficiaires (assurés et ayants droits) de l'Aide médicale d'Etat (AME) en 2008 : 6.444
- ❖ Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) en 2006 : 13,6 % (moyenne régionale : 11,0 %)

Indicateurs socio-sanitaires



* TSM : Taux standardisé de mortalité pour 100.000 et TSI : Taux standardisé d'incidence pour 100.000
Standardisation sur la population européenne.




Notes sur les indicateurs (définition, année de production, sources)

1. 2007, Insee. 2. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 3. % de personnes de ≥ 15 ans non scolarisées n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme, 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 4. Données provisoires en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières, 1er trimestre 2010, Insee. 5. Enfants de < 20 ans vivant dans un ménage sous le seuil de revenus de 903 euros par unité de consommation, 2006, Mipex 6. 2009, Cnamts, MSA, RSI, Insee 7. 2006, Insee, exploitation ORS IDF 8-11. 2007, Insee 12-13. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 14-15. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 16-17. Mortalité avant 65 ans attribuable à certains comportements individuels, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. Les écarts importants de taux observés entre les départements et la France viennent en grande partie de la différence de déclaration des décès par suicide 18. 2006-2008, Insee 19-20. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 21-22. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 23-24. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 25-26. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 27-28. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 29. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 30-33. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 34-35. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 36-37. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 38-39. Incidence des accidents vasculaires cérébraux, 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 40. Estimation InVS des découvertes de séropositivité, données au 31.12.2008 corrigées pour la sous-déclaration, les délais et les valeurs manquantes - nd : non dispo. car transmission irrégulière et/ou sous-déclaration importante. Pour Paris : à considérer avec prudence (transmission irrégulière + données manquantes). Données IDF et France entière issues du BEHWeb n°2, Novembre 2009. Insee : données du recensement 2006 41. stade sida ou symptomatique non sida, données, hors stade clinique non renseigné, au 31.12.2008, InVS, exploitation ORS IDF 42. 2007, Inserm CépiDc 43. 2008, InVS 44-45. 2006, InVS, Insee, exploitation ORS IDF 46-47. Sous-déclaration des décès par suicide dans les départements franciliens relevant territorialement de l'Institut médico-légal de Paris (hors Val-d'Oise et Yvelines), 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 48-53. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 54. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 55-56. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 57. 2008, OFDT, Escapad 2008 58-59. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 60. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 61. Ventes annuelles en pharmacie de ville pour 100 habitants de 20-39 ans, exprimé en nombre "théorique" de boîtes de comprimés de Subutex® dosés à 8 mg, 2008, Iliad/OFDT - InVS 62. 2006, Iliad/OFDT - CépiDc.

Nous remercions Frédéric Imbert, ORS Alsace, de l'aide apportée pour la réalisation des graphiques.


Disparités sociales et territoriales

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus parmi la population par commune en 2007




Source : Insee, recensement de la population

Part des bénéficiaires de la CMU par commune au 31 décembre 2008




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les hommes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les femmes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

* Le découpage « canton ville » de l'Insee est un regroupement d'une (en zone urbaine) ou plusieurs (en zone rurale) commune(s) entière(s).

Ce document a été élaboré par Sandrine Halfen, Adrien Saunal, Pierre Laurent, Philippe Pépin et Isabelle Grémy


Observatoire régional de santé d'Ile-de-France
 21-23, RUE MIOLLIS 75732 PARIS CEDEX 15 - TÉL : 01 44 42 64 70 - FAX : 01 44 42 64 71
 e-mail : ors-idf@ors-idf.org - Site internet : www.ors-idf.org

L'ORS Ile-de-France est subventionné par
 la Préfecture de région d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
 et par le Conseil régional d'Ile-de-France

ISBN : 978-2-7371-1793-0

Octobre 2010

Profil socio-sanitaire Hauts-de-Seine




92




Indicateurs socio-démographiques

- ❖ Population totale en 2006 : 1.536.096
 - Dont moins de 20 ans : 24,8 %
 - Dont 75 ans et plus : 7,0 %
 - Dont vivant seuls : 44,5 %
- ❖ Part des étrangers en 2006 : 11,5 % (moyenne régionale : 12,4 %)
- ❖ Naissances vivantes en 2008 : 25.217
 - Dont mères âgées de moins de 20 ans : 0,8 %
 - Dont mères âgées de 35 ans et plus : 29,4 %
- ❖ Indice conjoncturel de fécondité en 2007 : 1,96 enfants par femme
- ❖ Familles monoparentales en 2006 : 16,3 %
- ❖ Professions et catégories sociales en 2006
 - Part des cadres : 35,8 %
 - Part des ouvriers : 9,9 %
- ❖ Personnes de 15 ans et plus jamais scolarisées ou scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme en 2006 : 9,9 %
- ❖ Chômage parmi les actifs en 2010 : 7,7 %
- ❖ Revenu fiscal médian par unité de consommation en 2007 : 23.671 € (moyenne régionale : 20.575 €)
- ❖ Ménages dont au moins 75 % des ressources viennent des prestations des Caisses d'allocations familiales en 2008 : 4,8 % (moyenne régionale : 6,1 %)
- ❖ Enfants de moins de 20 ans vivant dans un ménage à bas revenus (moins de 903 euros par unité de consommation) en 2006 : 15,0 %
- ❖ Bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en 2009 : 4,0 %
- ❖ Nombre de bénéficiaires (assurés et ayants droits) de l'Aide médicale d'Etat (AME) en 2008 : 8.814
- ❖ Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) en 2006 : 10,8 % (moyenne régionale : 11,0 %)

Indicateurs socio-sanitaires






Notes sur les indicateurs (définition, année de production, sources)

1. 2007, Insee. 2. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 3. % de personnes de ≥ 15 ans non scolarisées n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme, 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 4. Données provisoires en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières, 1er trimestre 2010, Insee. 5. Enfants de < 20 ans vivant dans un ménage sous le seuil de revenus de 903 euros par unité de consommation, 2006, Mips 6. 2009, Cnamts, MSA, RSI, Insee 7. 2006, Insee, exploitation ORS IDF 8-11. 2007, Insee 12-13. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 14-15. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 16-17. Mortalité avant 65 ans attribuable à certains comportements individuels, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. Les écarts importants de taux observés entre les départements et la France viennent en grande partie de la différence de déclaration des décès par suicide 18. 2006-2008, Insee 19-20. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 21-22. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 23-24. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 25-26. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 27-28. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 29. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 30-33. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 34-35. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 36-37. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 38-39. Incidence des accidents vasculaires cérébraux, 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 40. Estimation InVS des découvertes de séropositivité, données au 31.12.2008 corrigées pour la sous-déclaration, les délais et les valeurs manquantes - nd : non dispo. car transmission irrégulière et/ou sous-déclaration importante. Pour Paris : à considérer avec prudence (transmission irrégulière + données manquantes). Données IDF et France entière issues du BEHWeb n°2, Novembre 2009. Insee : données du recensement 2006 41. stade sida ou symptomatique non sida, données, hors stade clinique non renseigné, au 31.12.2008, InVS, exploitation ORS IDF 42. 2007, Inserm CépiDc 43. 2008, InVS 44-45. 2006, InVS, Insee, exploitation ORS IDF 46-47. Sous-déclaration des décès par suicide dans les départements franciliens relevant territorialement de l'Institut médico-légal de Paris (hors Val-d'Oise et Yvelines), 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 48-53. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 54. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 55-56. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 57. 2008, OFDT, Escapad 2008 58-59. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 60. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 61. Ventes annuelles en pharmacie de ville pour 100 habitants de 20-39 ans, exprimé en nombre "théorique" de boîtes de comprimés de Subutex® dosés à 8 mg, 2008, Iliad/OFDT - InVS 62. 2006, Iliad/OFDT - CépiDc.

Nous remercions Frédéric Imbert, ORS Alsace, de l'aide apportée pour la réalisation des graphiques.


Disparités sociales et territoriales

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus parmi la population par commune en 2007




Source : Insee, recensement de la population

Part des bénéficiaires de la CMU par commune au 31 décembre 2008




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les hommes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les femmes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

* Le découpage « canton ville » de l'Insee est un regroupement d'une (en zone urbaine) ou plusieurs (en zone rurale) commune(s) entière(s).


Ce document a été élaboré par Sandrine Halfen, Adrien Saunal, Pierre Laurent, Philippe Pépin et Isabelle Grémy


Observatoire régional de santé d'Ile-de-France
 21-23, RUE MIOLLIS 75732 PARIS CEDEX 15 - TÉL : 01 44 42 64 70 - FAX : 01 44 42 64 71
 e-mail : ors-idf@ors-idf.org - Site internet : www.ors-idf.org

L'ORS Ile-de-France est subventionné par
 la Préfecture de région d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
 et par le Conseil régional d'Ile-de-France

ISBN : 978-2-7371-1793-0

Indicateurs socio-sanitaires






Notes sur les indicateurs (définition, année de production, sources)

1. 2007, Insee. 2. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 3. % de personnes de ≥ 15 ans non scolarisées n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme, 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 4. Données provisoires en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières, 1er trimestre 2010, Insee. 5. Enfants de < 20 ans vivant dans un ménage sous le seuil de revenus de 903 euros par unité de consommation, 2006, Mipes 6. 2009, Cnamts, MSA, RSI, Insee 7. 2006, Insee, exploitation ORS IDF 8-11. 2007, Insee 12-13. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 14-15. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 16-17. Mortalité avant 65 ans attribuable à certains comportements individuels, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. Les écarts importants de taux observés entre les départements et la France viennent en grande partie de la différence de déclaration des décès par suicide 18. 2006-2008, Insee 19-20. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 21-22. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 23-24. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 25-26. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 27-28. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 29. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 30-33. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 34-35. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 36-37. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 38-39. Incidence des accidents vasculaires cérébraux, 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 40. Estimation InVS des découvertes de séropositivité, données au 31.12.2008 corrigées pour la sous-déclaration, les délais et les valeurs manquantes - nd : non dispo. car transmission irrégulière et/ou sous-déclaration importante. Pour Paris : à considérer avec prudence (transmission irrégulière + données manquantes). Données IDF et France entière issues du BEHWeb n°2, Novembre 2009. Insee : données du recensement 2006 41. stade sida ou symptomatique non sida, données, hors stade clinique non renseigné, au 31.12.2008, InVS, exploitation ORS IDF 42. 2007, Inserm CépiDc 43. 2008, InVS 44-45. 2006, InVS, Insee, exploitation ORS IDF 46-47. Sous-déclaration des décès par suicide dans les départements franciliens relevant territorialement de l'Institut médico-légal de Paris (hors Val-d'Oise et Yvelines), 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 48-53. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 54. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 55-56. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 57. 2008, OFDT, Escapad 2008 58-59. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 60. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 61. Ventes annuelles en pharmacie de ville pour 100 habitants de 20-39 ans, exprimé en nombre "théorique" de boîtes de comprimés de Subutex® dosés à 8 mg, 2008, Iliad/OFDT - InVS 62. 2006, Iliad/OFDT - CépiDc.

Nous remercions Frédéric Imbert, ORS Alsace, de l'aide apportée pour la réalisation des graphiques.


Disparités sociales et territoriales

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus parmi la population par commune en 2007




Source : Insee, recensement de la population

Part des bénéficiaires de la CMU par commune au 31 décembre 2008




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les hommes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les femmes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

* Le découpage « canton ville » de l'Insee est un regroupement d'une (en zone urbaine) ou plusieurs (en zone rurale) commune(s) entière(s).

Ce document a été élaboré par Sandrine Halfen, Adrien Saunal, Pierre Laurent, Philippe Pépin et Isabelle Grémy


Observatoire régional de santé d'Ile-de-France
 21-23, RUE MIOLLIS 75732 PARIS CEDEX 15 - TÉL : 01 44 42 64 70 - FAX : 01 44 42 64 71
 e-mail : ors-idf@ors-idf.org - Site internet : www.ors-idf.org

L'ORS Ile-de-France est subventionné par
 la Préfecture de région d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
 et par le Conseil régional d'Ile-de-France

ISBN : 978-2-7371-1793-0

Octobre 2010


Profil socio-sanitaire Val-de-Marne




Indicateurs socio-démographiques

- ❖ Population totale en 2006 : 1.298.341
Dont moins de 20 ans : 25,6 %
Dont 75 ans et plus : 6,5 %
Dont vivant seuls : 42,6 %
- ❖ Part des étrangers en 2006 : 12,6 % (moyenne régionale : 12,4 %)
- ❖ Naissances vivantes en 2008 : 20.736
Dont mères âgées de moins de 20 ans : 1,1 %
Dont mères âgées de 35 ans et plus : 25,3 %
- ❖ Indice conjoncturel de fécondité en 2007 : 2,03 enfants par femme
- ❖ Familles monoparentales en 2006 : 17,4 %
- ❖ Professions et catégories sociales en 2006
Part des cadres : 23,1 %
Part des ouvriers : 14,9 %
- ❖ Personnes de 15 ans et plus jamais scolarisées ou scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme en 2006 : 12,7 %
- ❖ Chômage parmi les actifs en 2010 : 8,1 %
- ❖ Revenu fiscal médian par unité de consommation en 2007 : 19.923 € (moyenne régionale : 20.575 €)
- ❖ Ménages dont au moins 75 % des ressources viennent des prestations des Caisses d'allocations familiales en 2008 : 6,6 % (moyenne régionale : 6,1 %)
- ❖ Enfants de moins de 20 ans vivant dans un ménage à bas revenus (moins de 903 euros par unité de consommation) en 2006 : 20,8 %
- ❖ Bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en 2009 : 5,3 %
- ❖ Nombre de bénéficiaires (assurés et ayants droits) de l'Aide médicale d'Etat (AME) en 2008 : 12.550
- ❖ Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) en 2006 : 10,5 % (moyenne régionale : 11,0 %)

Indicateurs socio-sanitaires






Notes sur les indicateurs (définition, année de production, sources)

1. 2007, Insee. 2. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 3. % de personnes de ≥ 15 ans non scolarisées n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme, 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 4. Données provisoires en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières, 1er trimestre 2010, Insee. 5. Enfants de < 20 ans vivant dans un ménage sous le seuil de revenus de 903 euros par unité de consommation, 2006, Mipes 6. 2009, Cnamts, MSA, RSI, Insee 7. 2006, Insee, exploitation ORS IDF 8-11. 2007, Insee 12-13. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 14-15. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 16-17. Mortalité avant 65 ans attribuable à certains comportements individuels, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. Les écarts importants de taux observés entre les départements et la France viennent en grande partie de la différence de déclaration des décès par suicide 18. 2006-2008, Insee 19-20. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 21-22. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 23-24. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 25-26. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 27-28. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 29. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 30-33. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 34-35. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 36-37. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 38-39. Incidence des accidents vasculaires cérébraux, 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 40. Estimation InVS des découvertes de séropositivité, données au 31.12.2008 corrigées pour la sous-déclaration, les délais et les valeurs manquantes - nd : non dispo. car transmission irrégulière et/ou sous-déclaration importante. Pour Paris : à considérer avec prudence (transmission irrégulière + données manquantes). Données IDF et France entière issues du BEHWeb n°2, Novembre 2009. Insee : données du recensement 2006 41. stade sida ou symptomatique non sida, données, hors stade clinique non renseigné, au 31.12.2008, InVS, exploitation ORS IDF 42. 2007, Inserm CépiDc 43. 2008, InVS 44-45. 2006, InVS, Insee, exploitation ORS IDF 46-47. Sous-déclaration des décès par suicide dans les départements franciliens relevant territorialement de l'Institut médico-légal de Paris (hors Val-d'Oise et Yvelines), 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 48-53. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 54. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 55-56. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 57. 2008, OFDT, Escapad 2008 58-59. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 60. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 61. Ventées annuelles en pharmacie de ville pour 100 habitants de 20-39 ans, exprimé en nombre "théorique" de boîtes de comprimés de Subutex® dosés à 8 mg, 2008, Iliad/OFDT - InVS 62. 2006, Iliad/OFDT - CépiDc.

Nous remercions Frédéric Imbert, ORS Alsace, de l'aide apportée pour la réalisation des graphiques.


Disparités sociales et territoriales

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus parmi la population par commune en 2007




Source : Insee, recensement de la population

Part des bénéficiaires de la CMU par commune au 31 décembre 2008




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les hommes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les femmes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

* Le découpage « canton ville » de l'Insee est un regroupement d'une (en zone urbaine) ou plusieurs (en zone rurale) commune(s) entière(s).

Ce document a été élaboré par Sandrine Halfen, Adrien Saunal, Pierre Laurent, Philippe Pépin et Isabelle Grémy


Observatoire régional de santé d'Ile-de-France
 21-23, RUE MIOLLIS 75732 PARIS CEDEX 15 - TÉL : 01 44 42 64 70 - FAX : 01 44 42 64 71
 e-mail : ors-idf@ors-idf.org - Site internet : www.ors-idf.org

L'ORS Ile-de-France est subventionné par
 la Préfecture de région d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
 et par le Conseil régional d'Ile-de-France

ISBN : 978-2-7371-1793-0

Octobre 2010

Profil socio-sanitaire Val-d'Oise



Principales communes de plus de 10.000 habitants


95




Indicateurs socio-démographiques

- ❖ Population totale en 2006 : 1.157.054
 - Dont moins de 20 ans : 29,1 %
 - Dont 75 ans et plus : 5,1 %
 - Dont vivant seuls : 39,0 %
- ❖ Chômage parmi les actifs en 2010 : 9,0 %
- ❖ Revenu fiscal médian par unité de consommation en 2007 : 19.044 € (moyenne régionale : 20.575 €)
- ❖ Part des étrangers en 2006 : 11,1 % (moyenne régionale : 12,4 %)
- ❖ Ménages dont au moins 75 % des ressources viennent des prestations des Caisses d'allocations familiales en 2008 : 6,0 % (moyenne régionale : 6,1 %)
- ❖ Naissances vivantes en 2008 : 18.761
 - Dont mères âgées de moins de 20 ans : 1,6 %
 - Dont mères âgées de 35 ans et plus : 22,2 %
- ❖ Enfants de moins de 20 ans vivant dans un ménage à bas revenus (moins de 903 euros par unité de consommation) en 2006 : 21,3 %
- ❖ Indice conjoncturel de fécondité en 2007 : 2,22 enfants par femme
- ❖ Bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en 2009 : 5,6 %
- ❖ Familles monoparentales en 2006 : 15,5 %
- ❖ Professions et catégories sociales en 2006
 - Part des cadres : 17,5 %
 - Part des ouvriers : 18,3 %
- ❖ Nombre de bénéficiaires (assurés et ayants droits) de l'Aide médicale d'Etat (AME) en 2008 : 6.441
- ❖ Personnes de 15 ans et plus jamais scolarisées ou scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme en 2006 : 13,5 %
- ❖ Part des habitants vivant dans des Zones urbaines sensibles (ZUS) en 2006 : 16,1 % (moyenne régionale : 11,0 %)

Indicateurs socio-sanitaires






Notes sur les indicateurs (définition, année de production, sources)

1. 2007, Insee. 2. 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 3. % de personnes de ≥ 15 ans non scolarisées n'ayant jamais été scolarisées ou ayant été scolarisées jusqu'en primaire ou jusqu'au collège sans diplôme, 2006, Insee, exploitation ORS IDF. 4. Données provisoires en moyenne trimestrielle et corrigées des variations saisonnières, 1er trimestre 2010, Insee. 5. Enfants de < 20 ans vivant dans un ménage sous le seuil de revenus de 903 euros par unité de consommation, 2006, Mipes 6. 2009, Cnamts, MSA, RSI, Insee 7. 2006, Insee, exploitation ORS IDF 8-11. 2007, Insee 12-13. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 14-15. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 16-17. Mortalité avant 65 ans attribuable à certains comportements individuels, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF. Les écarts importants de taux observés entre les départements et la France viennent en grande partie de la différence de déclaration des décès par suicide 18. 2006-2008, Insee 19-20. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 21-22. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 23-24. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 25-26. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 27-28. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 29. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 30-33. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 34-35. 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 36-37. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 38-39. Incidence des accidents vasculaires cérébraux, 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 40. Estimation InVS des découvertes de séropositivité, données au 31.12.2008 corrigées pour la sous-déclaration, les délais et les valeurs manquantes - nd : non dispo. car transmission irrégulière et/ou sous-déclaration importante. Pour Paris : à considérer avec prudence (transmission irrégulière + données manquantes). Données IDF et France entière issues du BEHWeb n°2, Novembre 2009. Insee : données du recensement 2006 41. stade sida ou symptomatique non sida, données, hors stade clinique non renseigné, au 31.12.2008, InVS, exploitation ORS IDF 42. 2007, Inserm CépiDc 43. 2008, InVS 44-45. 2006, InVS, Insee, exploitation ORS IDF 46-47. Sous-déclaration des décès par suicide dans les départements franciliens relevant territorialement de l'Institut médico-légal de Paris (hors Val-d'Oise et Yvelines), 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee 48-53. 2006-2008, Cnamts, MSA, RSI, Canam, exploitation ORS IDF 54. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 55-56. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 57. 2008, OFDT, Escapad 2008 58-59. Mortalité avant 65 ans, 2005-2007, Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS IDF 60. Usage au moins 10 fois au cours du dernier mois, 2008, OFDT, Escapad 61. Ventes annuelles en pharmacie de ville pour 100 habitants de 20-39 ans, exprimé en nombre "théorique" de boîtes de comprimés de Subutex® dosés à 8 mg, 2008, Iliad/OFDT - InVS 62. 2006, Iliad/OFDT - CépiDc.

Nous remercions Frédéric Imbert, ORS Alsace, de l'aide apportée pour la réalisation des graphiques.


Disparités sociales et territoriales

Pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus parmi la population par commune en 2007




Source : Insee, recensement de la population

Part des bénéficiaires de la CMU par commune au 31 décembre 2008




Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les hommes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

Niveau de mortalité prématurée (< 65 ans) chez les femmes par canton* - période 2004-2007



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Ile-de-France

* Le découpage « canton ville » de l'Insee est un regroupement d'une (en zone urbaine) ou plusieurs (en zone rurale) commune(s) entière(s).

Ce document a été élaboré par Sandrine Halfen, Adrien Saunal, Pierre Laurent, Philippe Pépin et Isabelle Grémy

Observatoire régional de santé d'Ile-de-France
 21-23, RUE MIOLLIS 75732 PARIS CEDEX 15 - TÉL : 01 44 42 64 70 - FAX : 01 44 42 64 71
 e-mail : ors-idf@ors-idf.org - Site internet : www.ors-idf.org

L'ORS Ile-de-France est subventionné par
 la Préfecture de région d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
 et par le Conseil régional d'Ile-de-France

ISBN : 978-2-7371-1793-0

Octobre 2010